



KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK
XVII. KONGRESSZUSA

PROGRAMFÜZET
Zalakaros • 2010. április 16–18.



Ideális thrombohaemorrhagiás egyensúly



- Testsúlyra és rizikóra illesztett adagolás
- Hatékonyság kevesebb szövődménnyel^{1,2}

Fraxiparine®
nadroparin

FRAXIPARINE rövidített alkalmazási előírás

Hatóanyag: INJEKCIÓK: 1900 AXa NE (0,2 ml), 2850 AXa NE (0,3ml), 3800 AXa NE (0,4 ml), 5700 AXa NE (0,6 ml), 7600 AXa NE (0,8 ml) és 9500 AXa NE (1,0 ml) nadroparin-kalcium előretöltött fecskendőként. **TÖBBADAGOS INJEKCIÓ:** 47500 AXa NE (5 ml) nadroparin-kalcium üvegenként. **Javallatok:** Tromboembóliás megbetegedések megelőzése, kezelése. Haemodialysis alatt az alvadék képződés megelőzése. Instabil angina és non-Q myocardialis infarctus kezelése kis dózisu acetylcholinesterase egyidejű adása mellett. **Ellenjavallatok:** Fraxiparine túlérzékenység. Fraxiparine kezelés mellett kialakult thrombocytopenia, haemo stasis zavaraival összefüggő aktív vérzés (kivéve a heparinnal nem kapcsolatos DIC). Vérzésre hajlamosító szervkárosodások. Akut infektiós endocarditis (kivéve mechanikus műbillentyű). Akut agyi vérzéses katasztrófák. 3 éves kor alatti gyermekeknek és terheseknek nem alkalmazhatók a Fraxiparine Multi többadagos injekciók, mivel benzilalkoholt tartalmaznak. Súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clearance 30 ml/perc alatt) a terápiás dózis adása. **Adagolás és alkalmazás:** PREVENCIÓ: Általános beutazás: 2-4 órával a beavatkozás előtt, majd napi 1x0,3 ml sc., min. 7 napig. Ortopéd sebészet: a beteg testtömege alapján műtét előtt és után 12 órával ill. ezt követően 3 napig 1x38 NE/tkg (0,2-0,4 ml) sc., majd napi 1x57 NE/tkg (0,3-0,6 ml) sc. A kezelés időtartama legalább 10 nap. **TROMBOEMBÓLIÁS MEGBETEGÉDESEK TERÁPIÁJA:** a beteg testtömege alapján 85 NE/tkg (0,4-1,0 ml) sc. naponta kétszer. **HAEMODYALYSIS:** 65 NE/tkg (0,3-0,6 ml) a dializáló kör artériás szűrőjébe. Fokozott vérzésveszély vagy progresszív vérzéses rendellenesség veszélye esetén az adagot csökkenteni kell. **INSTABIL ANGINA ÉS NON-Q MYOCARDIALIS IN-**

FARCTUS: a Fraxiparine-t sc. naponta 2x (12 óránként) napi 75-325 mg per os adott acetylcholinesteraseval együtt kell alkalmazni. A kezdő adag iv. bolusban 86 NE/kg, melyet 86 NE/kg sc. Fraxiparine injekció követ. Az átlagos kezelési idő 6 nap. A dózist a testtömeghez kell illeszteni. Súlyos veseelégtelenség esetén profilaktikus alkalmazásnál az adagot 25-33%-kal kell csökkenteni, míg nadroparin terápiás alkalmazásánál ellenjavallt. Közepesen súlyos veseelégtelenség esetén a thromboembolia és haemorrhagia egyéni kockázatát figyelembe véve az adag 25-33%-kal csökkenthető mind terápiás, mind profilaktikus alkalmazásnál. **Mellékhatások:** vérzések, thrombocytopenia, suffusio vagy haematoma (előfordulása ritkább, mint heparin alkalmazása esetén), a beadás helyén bőrcnecrosis, eosinophilia, túlérzékenységi reakciók, Se-transzaminase értékek emelkedése, priapismus, hypoadosterionismus, esetleg osteoporosis (hosszú ideig tartó adagolás esetén). **Figyelmeztetés:** Im. nem adható. Thrombocytaszám observatio! A kezelés előtt; az első hónapban heti 2 alkalommal, majd ezt követően heti 1 alkalommal. Ezen kívül alvadási paraméterek ellenőrzésére nincs szükség. Májelégtelenség, veseelégtelenség, artériás hypertonia, a chorio-retina vascularis rendellenességei, az anamnézisben szereplő peptikus ulcus, vagy egyéb, vérzésre hajlamosító szervkárosodás esetében fokozott ellenőrzés szükséges! A plazma K⁺-szintet nagy rizikójú betegeknek monitorozni kell. Terhesség: haszon-kockázat mérlegelése. Szoptatás alatt adása nem javasolt. **Kiadhatóság:** korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer (J). **Alkalmazási előírás ellenőrzésének dátuma:** 2009. december 2.

A Fraxiparine® kiszerezésenkénti térítési díja emelt, indikációhoz (4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e)* kötött, 90%-os támogatás esetén:

	Kiszerezés	Bruttó fogyasztói ár	Támogatás mértéke	Beteg térítési díja
Fraxiparine 1900 NE 0.2 ml injekció	10x0.2 ml	3467 Ft	2887 Ft	580 Ft
Fraxiparine 2850 NE 0.3 ml injekció	10x0.3 ml	5112 Ft	4330 Ft	782 Ft
Fraxiparine 3800 NE 0.4 ml injekció	10x0.4 ml	6663 Ft	5774 Ft	889 Ft
Fraxiparine 5700 NE 0.6 ml injekció	10x0.6 ml	9549 Ft	8144 Ft	1405 Ft
Fraxiparine 7600 NE 0.8 ml injekció	10x0.8 ml	12078 Ft	9278 Ft	2800 Ft
Fraxiparine 9500 NE 1 ml injekció	10x1 ml	13730 Ft	11598 Ft	2332 Ft

* www.oep.hu, 2010. január 1.

Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást! További információért forduljon képviselőtűnkhez.


1124 Budapest, Csörsz u. 43. MOM Park, Gesztenyes Torony
Tel.: (06-1) 225-5300 • Fax: (06-1) 225-5302 • www.gsk.hu

Referenciák:

1. Simonneau G et al. J Thromb Haemost 2006; 4:1693-1700.

2. Albanese C et al. Curr Ther Res 1992; 51(3):469-475.

Kórházi Gyógyszerészek XVII. Kongresszusa



2010. április 16–18.
Zalakaros

Rendezi

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete

A Kórházi Gyógyszerészek XVII. Kongresszusának Rendező Bizottsága

A kongresszus fővédnökei:

Prof. Klebovich Imre

elnök

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

és

Prof. Botz Lajos

tudományos alelnök

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

A kongresszus főszervezője:

Higyisán Ilona

elnök

Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet

A Tudományos Bizottság elnöke:

Prof. Soós Gyöngyvér

Tagjai:

Botz Lajos

Hankó Balázs

Pintye János

Trestyánszky Zoltán

A Szervező Bizottság elnöke:

Szabó Csongor

Tagjai:

Cseh Ibolya

Hajagosné Hümpfner Rózsa

Kis Szölgyémi Mónika

Szél Mária

Takácsné Burkus Margit

Tisztelt Kongresszusi Résztevő! Kedves Kolléga!

Új év, új remények, újabb rendezvények, kongresszusok, így van ez Szervezetünk életében is. Az őszi "nagy" gyógyszerész kongresszus után rendre következik a "miénk", a szokásos két évente sorra kerülő, immáron a XVII. Kórházi Gyógyszerészek Kongresszusa, amelynek aktuális időszak magyarázza a választott témáját:

Kórházi betegellátás válság idején

Diagnosztika – Képkalkáló eljárások
 Antivirális terápiák újdonságai és a védőoltások
 Mérgezők gyógyszerészeti szempontból, antidótumok
 Humán klinikai farmakológiai vizsgálatok
 Behozott gyógyszerek problematikája
 Gyógyszerellátás válság idején

Ezek között van olyan, amelyről az utóbbi években nem sok szó esett rendezvényeinken (képkalkáló diagnosztika, antivirális terápia, mérgezők), a fennmaradókról meg nem lehet eleget beszélni, folyamatosan megújuló gondot jelentenek.

Egészségpolitikai blokk keretében felkért előadók tájékoztatják a kollegákat a racionális egészségpolitika és ágazati működés esélyeiről, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséről válságban, valamint a finanszírozás és a gyógyszerköltségek menedzselésének sajátosságairól.

Reméljük, hogy sikerült a kórházi „gyógyszerész-család” tagjai számára valóban széles érdeklődésre számot tartó témákat választanunk.

A helyszín abszolút újdonság Szervezetünk történetében, jóllehet a gyógyfürdő közeledik az ötvenedik évéhez. Honlapjuk információja szerint: 1965-től építik, fejlesztik, bővítik a fürdőt az odalátogató vendégek igényeinek legteljesebb kiszolgálása érdekében. Céljuk, hogy a „Generációk találkozóhelyei” legyenek, ahol a gyógyvízre épülő gyógyászati kezelések széles skálája mellett a másik nem minősített, de ettől függetlenül értékes ásványi anyag tartalmú termálvízzel a Gyógycentrum-Élményfürdő blokkban a rekreációt és a felüdülést szolgálják.

A Kórházi Gyógyszerészek XVII. Kongresszusa, legyen szervezetünk életében is „Generációk találkozóhelye”, ahol a szép számmal jelen lévő ifjú kollegáinknak módja lesz a tapasztaltabb szakemberekkel eszmét cserélni és közös erővel, bölcs összefogással átsegíteni (fellendíteni) a kórházi gyógyszerészet ügyét a válság idején (is)!

Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelti kongresszusunkat és hasznos tanácskozást, valamint jó szórakozást kívánunk!

Soós Gyöngyvér
 Tudományos Bizottság elnöke

Higysán Ilona
 KGYSZ elnöke

Általános információk

Pre-kongresszusi Szimpózium időpontja:

2010. április 16. 10.00 – 12.00 óra

Kongresszusi megnyitó:

2010. április 16. 13.00 óra

A kongresszus zárása:

2010. április 18. 13.00 óra

Kongresszusi iroda nyitva tartása:

2010. április 16. 08.30 – 19.00 óra

2010. április 17. 08.30 – 18.00 óra

2010. április 18. 08.30 – 13.00 óra

A kongresszus helyszíne:

Hotel Karos Spa****

Zalakaros, Alma utca 1.

Gála terem

Szálláshelyek és étkezések helyszíne:

Hotel Karos Spa

A kiállítás helyszíne:

Hotel Karos Spa

Gála terem előtere és a Hall

Kísérő programok:

2010. április 16. 20.30 óra

Fogadás a Hotel Karos Spa Éden éttermében

2010. április 17. 20.00 óra

Retro Party a Betyár Csárdában

Zalakaros, Jegenye sor 1.

Rendezvényszervező iroda:

„Club Service” Kft.

4024 Debrecen, Kossuth u. 3. I/1.

Tel.: 52 / 522-222

Fax: 52 / 522-223

E-mail: clubservice@clubservice.hu

Web: www.clubservice.hu

A KONGRESSZUS PROGRAMJA

2010. április 16. – péntek

08.30 – Érkezés, regisztráció

10.00 – 12.00 **Pre-kongresszusi Szimpózium**

Orvosi képzés:
diagnosztikai módszerek, izotóp diagnosztika, kontrasztfokozók
Üléselnökök: Prof. Soós Gyöngyvér, Hetényi Ferenc

P-1 Korszerű nukleáris medicina napjainkban
Prof. Pávics László
SzTE ÁOK Nukleáris Medicina Intézet, Szeged

**P-2 Modern radiológiai képző eljárások a mindennapi
betegellátás segítésére**
Nagy Gyöngyi
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

P-3 Kontrasztfokozók
Somosi Gábor
Radizone Diagnost-X Ltd., Budapest

P-4 Angiográfia a napi gyakorlatban
Szilvássy Péter
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest

11.30 – 13.00 Ebéd

13.00 – 14.30 **Megnyitó**
Kitüntetések átadása

14.30 – 16.00 **Egészségpolitika**
Üléseelnök: Prof. Botz Lajos

E-1 Egy racionális egészségpolitika és ágazati működés esélyei Magyarországon
Oberfrank Ferenc
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest

E-2 Az egészségügyi rendszer előtt álló egészségpolitikai kihívások
Sinkó Eszter
SE Egészségügyi Menedzser Képző Intézet, Budapest

E-3 Egészség-gazdaság-politika
Rácz Jenő
Cholnoky Ferenc Kórház, Veszprém

16.00 – 16.30 Szünet

16.30 – 18.00 **Mérgeзések**
Üléseelnök: Prof. Klebovich Imre

E-4 Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás
Prof. Perjési Pál
PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs

E-5 Gyógynövénykészítmények lehetséges veszélyei
Prof. Szabó László Gyula
PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet, Pécs

E-6 Antidótumok az intézeti gyógyszerárban; a készletezés szervezésének kérdései
Cseh Ibolya
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Gyógyszertára, Budapest

E-7 Csodaszerek, hitek, kockázatok: Ártalmatlan étrendkiegészítők, gyógyteák?
Nádasdyné Unghváry Ildikó
DE OEC Egyetemi Gyógyszertár, Debrecen

18.00 – 18.45 **Táplálási Fórum**

Üléselnök: Szabó Csongor

**E-8 Otthoni parenterális táplálás –
szükséglet, lehetőség, realitás?**

Kálmán István

Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest

**E-9 Kórházi gyógyszerész szerepe a
parenterális táplálásban**

Schirm Szilvia

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet,

Központi Klinikai Gyógyszertár, Pécs

E-10 A gyermekek házi parenterális táplálásának problémái

Túrmezeiné Horváth Judit¹, Balogh Judit²

SE I. sz Gyermekklinika¹,

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet²,

Budapest

20.30 – Fogadás a Hotel Karos Spa Éden éttermében

2010. április 17. – szombat

09.00 – 10.30 **Kórházi antibiotikum politikáról újra!**

Üléselnök: Prof. Soós Gyöngyvér

E-11 A kórházi antibiotikum felhasználás: országos, regionális és osztályos adatok 1996-2007.

Benkő Ria, Matuz Mária

SzTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szeged

E-12 Az intézeti gyógyszerész szerepe a racionális antibiotikum terápiában (avagy miért is van szükség az „infektológus” gyógyszerészre?)

Buchholcz Gyula

Bajai Kórház Gyógyszerszállító, Baja

E-13 Antibiotikum felhasználás és rezisztencia alakulás a DE OEC intézeteiben

Kraszits István

DE OEC Egyetemi Gyógyszerszállító, Debrecen

E-14 Egy korszerű, új antithrombotikum a gyógyszerész szemszögéből

Takács Gézané

Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet Gyógyszerszállító, Békéscsaba

10.30 – 11.00 Szünet

11.00 – 12.30 **Antivirális terápia újdonságai és a védőoltások**

Üléselnök: Pintye János

E-15 Vírus epidemiák – tényleges veszély, vagy indukált pánik?

Osztoivits János

Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. sz. Belgyógyászat, Budapest

E-16 H1N1 mikrobiológiai diagnosztikai gondjai

Kovács Ida Juszti

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet, Szeged



EGIS ONKOLÓGIA

ÉLET. MINŐSÉG.



 **GRANEGIS®**
1mg, 2mg graniszetron

DERCIN®
1g, 200 mg gemcitabin

ANABREST®
anastrozol

etruzil®
2,5 mg letrozol

EGONK1

További információ: Egis Nyrt. Onkológia és CNS Üzletág, 1134 Budapest, Lehel u. 15.
tel.: 469-22-22, fax: 469-24-59, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu, lezárás dátuma: 2009. 10. 28.



**EUROMEDIC INTERNATIONAL
EUROMEDIC PHARMA ZRT
EUROMEDIC TRADING KFT**


**HATÉKONYSÁG
GYORSASÁG
PONTOSSÁG
MEGBÍZHATÓSÁG**



EUROMEDIC PARTNERSÉG

KÓRHÁZI ÖNKÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

1051 BUDAPEST, DOROTTYA UTCA 1. TEL: 266-9280, FAX: 266-6202



Humaglobin

**Human Albumin
5%, 20%**

Tetig 500

Humafactor 8-9

Magyar vérkészítmények

Magyar önkéntes és térítésmentes véradók donációjából származó (a Nemzeti vérvételek részét képező) plazmából előállított vérkészítmények. A plazmát az OVSZ szigorú vizsgálatait követően HCV-re NAT vizsgálattal ellenőrizzük. Virusinaktivációra hőkezelést alkalmazunk, mely az európai előírásoknak maximálisan megfelel.

**Magyar vérkészítmény:
Hazai gyártó – Európai minőség**

Human BioPlazma Kft.
H-2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 82.
Tel: +36 28 532-126, Fax: +36 28 432-043
E-mail: marketing@humanked.com
Web: www.humanked.com



A túlélés időtartamának jelentős mértékű meghosszabbítása
a kezelés mellékhatásainak egyidejű mérséklése mellett¹⁻⁵

ALIMTA®
pemetrexed

Megfelelő választás
a megfelelő betegnek

CÉLZOTT INDIKÁCIÓ

HATÉKONYSÁG ÉLETMINŐSÉG

Mesothelioma
Nem-laphámsejtes típusú
nem-kissejtes tüdőrák

ALIMTA Rövidített alkalmazási előírás: A gyógyszer megnevezése: ALIMTA 100 mg és 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz. **Minőségi és mennyiségi összetétel:** 100 mg és 500 mg pemetrexed (pemetrexed dinátrium formájában) injekciós üvegenként. 100 mg-os kiszerelés esetében az injekciós üveg tartalmát 4,2 ml az 500 mg-os kiszerelés esetében pedig 20 ml 9 mg/ml (0,9%) nátrium klorid oldatos injekcióval tovább hígítani 100 ml-re. **Terápiás javallatok:** Malignus pleurális mesothelioma: Az ALIMTA ciszplatinnal kombinációban a nem rezekálható malignus pleurális mesotheliomában szenvedő, előzetes kemoterápiában nem részesült betegek kezelésére javallt. Nem-kissejtes tüdőcarcinoma: Az ALIMTA ciszplatinnal kombinációban lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek első-vonalbeli kezelésére javallt, a szövettanilag dőntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével. Az ALIMTA monoterápiában, fennálló kezelésként olyan, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek kezelésére javallt (a szövettanilag dőntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével), akiknél a betegség nem progresszió közvetlenül a platina alapú kemoterápiát követően. Az első vonalbeli kezelés gemtabinnal, paklitaxellel vagy docetaxellel kombinált kettős platina kombináció kell legyen. Az ALIMTA monoterápiában a lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek második vonalbeli kezelésére javallt, a szövettanilag dőntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével. **Adagolás:** ALIMTA ciszplatinnal kombinációban 500 mg/m² testfelszín (BSA) intravénás infúzióban 10 perc alatt, minden 21 napos ciklus első napján. A ciszplatint javasolt adagja 75 mg/m² testfelszín, két óra alatt, kb.: 30 perccel a pemetrexed infúzió befejezését követően minden 21 napos ciklus első napján. A betegeket megfelelő antiemetikus kezelésben kell részesíteni és a szükséges folyadékbevitelről gondoskodni kell a ciszplatint adása előtt és/vagy után (lásd a ciszplatint alkalmazási előírását). ALIMTA monoterápiában: A nem-kissejtes tüdőcarcinoma miatt, előzetes kemoterápiát követően kezelt betegeknek az ALIMTA javasolt adagja 500 mg/m² BSA, iv infúzióban 10 perc alatt, minden 21 napos ciklus első napján. **Premedikáció:** kortikoszteroidot kell adni a pemetrexed adása előtt, alatti és utáni napon ekvivalens mennyiségű adagban a naponta kétszer, szjaón át adott 4 mg dexamethasone-nal. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. A szoptatást a pemetrexed-kezelés alatt le kell állítani. Egyidejű sárgaláz vakcináció. **Mellékhatások:** neutropenia, agranulocitózis, anaemia, trombocitopenia, hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, fáradtság, stomatitis, pharyngitis, szenzoros neuropathia, csökkent kreatinin clearance emelkedett kreatinin, bőrkütes/hámlás, hajhullás, anorexia. **ALIMTA (bruttó) fogyasztói ára:** 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 1 x 70 288 Ft. 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátum 1 x 347 872 Ft. A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/04/290/002. **Kérjük a gyógyszer alkalmazása előtt olvass el a teljes alkalmazási előírást, amely olvasható az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) internetes honlapján (<http://www.ema.europa.eu>) található, ill. kérésére rendelkezésére bocsátjuk! Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14. Tel.: +36-1-328-5100 A dokumentum lezárásának dátuma: 2009.07.28.**

Irodalom: 1. Alimta Alkalmazási Előírás 2. Vogelzang NJ.: JCO 21:2636-2644, 2003 3. Hanna, N.: JCO 22:1589-1597, 2004 4. Peterson, P.: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 363 5. Scagliotti, GV.: JCO 26, No 21, 2008

PEM-09-09-04

Lilly

A 100 éves sanofi-aventis/Chinoin kutatás-fejlesztésének középpontjában az Ön egészsége áll!

A sanofi-aventis/Chinoin Magyarország piacvezető, kutatóorientált, 100 éves hazai tradícióval bíró gyógyszeripari vállalata. A világ és Európa egyik vezető gyógyszergyáráként a sanofi-aventis csoport gyógyszerkínálata több millió ember egészségéhez járul hozzá a vénköteles, és nem-vénköteles termékek területén, a prevenciótól a kórházi kezelésig.

100
éves a

sanofi-aventis/Chinoin



sanofi aventis

Az egészség a legfontosabb

sanofi-aventis/Chinoin

1045 Budapest, Tó utca 1-5. • Gyógyszerinformációs szolgálat: (06-1) 505-0055
Tel.: (06-1) 505-0050 • Fax: (06-1) 505-0060 • www.sanofi-aventis.hu

E-17 Harctéri beszámoló: egy influenza centrum működése gyógyszerész szemmel

Egri Lászlóné¹, Hankó Balázs², Valkó Luca³
SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Gyógyszertár¹,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet²,
Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Klinika³, Budapest

E-18 Antivirális szerek farmakológiája

Király Kornél
SE Farmakológiai és Klinikai Farmakológiai Intézet,
Budapest

12.30 – 14.00 Ebéd

**14.00 – 14.30 Abbott Szimpózium –
Hitek és tévhitek az anesztézia költségeiről**

Üléselnök: Hajagosné Hümpfner Rózsa

E-19 Inhalációs narkotikumok beszerzésének speciális kérdései

Cseh Ibolya
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai Gyógyszertára, Budapest

E-20 Tények és tévhitek az anesztézia költségéről

Bátai István
PTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs

14.30 – 15.30 Invasív mycosisok kezelésének újabb lehetőségei

Üléselnök: Prof. Vincze Zoltán

**E-21 Invasív mycosisok kezelésének újabb lehetőségei és gyakorlata
a Semmelweis Egyetemen**

Hantos Mónika¹, Pálfi Dóra², Prof. Ludwig Endre³
SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet¹,
I. sz. Belgyógyászati Klinika², Infektológiai Tanszék³, Budapest

E-22 Mikafungin szerepe az invazív gombainfekciók kezelésében

Váradi Éva

Astellas Pharma Kft., Budapest

E-23 Szisztémás antimikotikumok klinikai alkalmazási tapasztalatai

Fittler András, Bősze Gergely, Hornyák Judit

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet,

Központi Klinikai Gyógyszertár, Pécs

15.30 – 16.00 Szünet

16.00 – 17.30 Onkológia*Üléselnök: Higyisán Ilona***E-24 Avastin kezelés a metasztatikus colorectalis tumorok esetében**

Jánosi Gabriella

SzTE ÁOK Kari Gyógyszertár, Szeged

**E-25 A vastagbélrák betegségterhének
egészség-gazdaságtani vonatkozásai**

Boncz Imre

PTE OEKK, Pécs

**E-26 A kórházi felhasználású gyógyszerterápiák
finanszírozásának aktualitásai**

Kiss Zsolt

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest

E-27 Citosztatikumok extravazációja, antidótumok

Bartal Alexandra

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

19.30 – Gyülekező a szálloda halljában, majd séta a csárdába

20.00 – Vacsora – Retro Party a Betyár Csárdában

2010. április 18. – vasárnap

09.00 – 11.00 **Klinikai gyógyszervizsgálatok**

Üléselnök: Prof. Zelko Romána

E-28 A megbízó (CRO) nézőpontja

Bödör Anikó

ICON Clinical Research Kft., Budapest

E-29 A hatóság elvárásai

Hermann Dóra

Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest

E-30 Etikai bizottság szerepe

Csukonyi Katalin

SzTE ÁOK Kari Gyógyszertár, Szeged

E-31 A gyógyszertár szempontjai

Szűcs Attila, Bartal Alexandra

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

**E-32 Intézeti gyógyszertárak előírt és vállalt feladatai a PTE KK
eljárási rendje és a nemzetközi tapasztalatok tükrében**

Molnár Béla

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet,

Központi Klinikai Gyógyszertár, Pécs

E-33 Vizsgálóból tervező – egyéni tapasztalatok

Szűcs Ferenc

PSI-CRO Magyarország Kft., Budapest

11.00 – 11.30 Szünet

11.30 – 13.00 **Szakmapolitikai Fórum**

Moderátor: Trestyánszky Zoltán

E-34 Behozott gyógyszerek kérdése

Ambrus Ildikó

Nyíró Gyula Kórház Gyógyszertára, Budapest

E-35 Gyógyszerellátás kritikus időkből

Hankó Balázs, Jákó Kinga

Semmelweis Egyetem, Budapest

13.00 – 13.10 **A kongresszus zárása**

13.10 – Ebéd, hazautazás

Főtámogatók:

Hungaropharma Zrt.

Teva Magyarország Zrt.

Kiemelt támogatók:

Abbott Laboratories Magyarország Kft.

Radizone Diagnost-X Ltd.

Roche Magyarország Kft.

Támogatók:

AstraZeneca Kft.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

Euromedic Pharma Zrt.

B. Braun Medical Kft.

Fresenius Kabi Hungary Kft.

GlaxoSmithKline Kft.

Human Bioplazma Kft.

Lilly Hungária Kft.

Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

Mölnlycke Health Care Kft.

Pfizer Kft.

Pharmacenter Hungary Kft.

ratiopharm Kft.

Richter Gedeon Nyrt.

Sandoz Hungária Kft.

Sanofi-Aventis Zrt.

Kiállítók:

Abbott Laboratories Magyarország Kft.

Allegro Kft.

Amgen Kft.

Astellas Pharma Kft.

AstraZeneca Kft.

Baxter Hungary Kft.

Bayer Hungária Kft.

Biotest Hungaria Kft.

B. Braun Medical Kft.

Hungaropharma Zrt.

Lilly Hungária Kft.

MSD Magyarország Kft.

Pfizer Kft.

SK Pont Kft.

A PATIKÁK PATIKÁJA

- TELJES TERMÉKPALETTA
- ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG
- MEGBÍZHATÓ LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
- VEVŐORIENTÁLT ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER
- EGYEDI VEVŐKEZELÉS
- RENDSZERES AKCIÓK
- FOLYAMATOS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÁS

KERESKEDŐHÁZAK

Budapest

Zöldszám: 06-80-50-50-50

Tel.: 06-1-429-9100

Rendelésfelvétel gyógyszerárak részére:

Fax: 06-1-429-9191

Rendelésfelvétel kórházak részére:

Fax: 06-1-429-9159

Békéscsaba

Rendelésfelvétel:

Zöldszám: 06-80-922-002

06-80-922-003, 06-80-922-004,

06-80-922-005, 06-80-922-006,

06-80-922-014

Fax: 06-66-547-810

Debrecen

Rendelésfelvétel:

Zöldszám: 06-80-203-838

Zöld faxszám: 06-80-203-842

Miskolc

Zöldszám: 06-80-200-022

Rendelésfelvétel: 06-46-531-137,

06-46-531-147, 06-46-531-157,

06-46-531-177, 06-46-531-187

Rendelésfelvétel faxszám: 06-46-531-190

Kaposvár

Zöldszám: 06-80-311-213

Rendelésfelvétel: 06-82-555-610,

06-82-555-611, 06-82-555-612,

06-82-555-613, 06-82-555-614,

06-82-555-615, 06-82-555-616

Központi faxszám: 06-82-555-601

Veszprém

Rendelésfelvétel:

Zöldszám: 06-80-949-279

Zöld faxszám: 06-80-949-269

Pécs

Zöldszám: 06-80-251-922

Rendelésfelvétel: 06-72-504-333

Rendelés felvétel faxszám: 06-72-504-339

Rendelés felvétel modem: 06-72-551-581

TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IRODÁK

Szombathely:

Zöldszám: 06-80-205-085

Fax: 06-94-514-894

Nyíregyháza: 06-42-506-961

Fax: 06-42-506-960

**A legjobb
hagyományokat
folytatjuk!**

Gyengéd és hatékony sebkezelés



Kótszer portfóliónk magába foglalja a nem szőtt alapú kótszerek, és egyedülálló Safetac® technológiával készült lágy szilikonos kötőanyagok széles választékát.

Ezen technológiával készült kótszerek nem ragadnak a nedves sebágyba, könnyed használatuk révén megakadályozzák a hámsejtek sérülését.

Puhák és gyengédek a beteghez, viselésük és eltávolításuk kényelmes és fájdalommentes.

Minimalizálják a macerációt, így biztosítva traumamentes és zavartalan sebgyógyulást.

Szolgáltatásaink részét képezi, hogy az igényfelmérés során elemezzük egy-egy sebtípus ellátási módját és költségét. Az intézmény egészét figyelembe véve teszünk költséghatékony megoldási javaslatokat a modern sebkezelési irányelveket magába foglaló sebkezelési rendszer kiépítésére.

Lezárva: 2008. július 3.

